

HEMORRAGIA

antes, durante o después del Parto



ASOCIACIÓN DE MÉDICOS
TRABAJANDO CON EL CORAZÓN A.C.

PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS NO. 253300201A2493



La hemorragia postparto se refiere a la pérdida sanguínea de más de 500 ml posterior al nacimiento sin importar la vía obstétrica de resolución, (parto / cesárea)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Hemorragia Obstétrica es la principal causa de mortalidad materna y morbilidad obstétrica extrema a nivel mundial con una incidencia del 6.09%. Cada año 14 millones de mujeres sufren de sangrado postparto y de ellas 125,000 fallecen. Usualmente, la mortalidad y morbilidad asociadas a este cuadro son debidas a fallas en la identificación de las causas y deficiencias para el tratamiento oportuno y adecuado.

En México se calcula 31.7 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, las principales causas de defunción son: Hemorragia obstétrica (22.3%), Enfermedad Hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (20.6%) y Aborto (7.9%). Los Estados que notifican mayor número de defunciones son: **Estado de México (94)**, Ciudad de México (53), Chiapas (47), Puebla (40) y Veracruz (40).

(Datos Obtenidos de la guía de PRÁCTICA CLÍNICA Prevención y manejo de la hemorragia obstétrica en el primero, segundo y tercer niveles de atención 2018

En la Clínica de Especialidades del Sagrado Corazón, tenemos como objetivos:

- Contribuir a disminuir la morbilidad materna por hemorragia postparto
- Identificar los factores de riesgo
- Establecer acciones preventivas
- Definir los criterios para realizar el diagnóstico de hemorragia postparto
- Implementar las intervenciones para el tratamiento
- Identificar las complicaciones
- Implementar las intervenciones para el tratamiento de las complicaciones de la hemorragia postparto

Lo anterior favorecerá la mejora en la calidad y efectividad de la atención médica contribuyendo, de esta manera, al bienestar de las personas y de las comunidades, el cual constituye el objetivo central y la razón de ser de los servicios de salud.

FACTORES DE RIESGO

Hemorragía antes, durante o después del Parto





- Embarazo Gemelar
- Antecedentes de Hemorragia postparto previa
- Estados hipertensivos del Embarazo
- Macrosomía fetal
(peso grande del bebé al nacer mas de 3,800)
- Polihidramnios
(mayor líquido amniótico de lo habitual)
- Anestesia general
- Anemia
- Diabetes Gestacional
- Hipotiroidismo
- Multiparidad (más de 3 embarazos)
- Cesárea iterativa (más de 2 cesáreas)
- Periodo intergénésico corto
(embarazo de menos de 2 años al anterior)
- Pacientes sin trabajo de parto
- Inserción baja de placenta
- Fecundación In vitro
- Cirugía uterina anterior
- Edad materna menores de 15
y mayores de 40 años
- Parto después de cesárea
- Obesidad >90 Kg o aumento de peso >20 kg en el embarazo
- O cuando su médico tratante lo considere necesario



Las **complicaciones de la hemorragia postparto** pueden ser más costosas que el mismo Paquete de Maternidad, por eso en la Clínica hemos diseñado un **Paquete Básico de prevención de la hemorragia materna**, que incluye medicamentos, insumos y equipos especiales para que en la medida de lo posible dichas complicaciones se traten de evitar.

Este Paquete tiene un costo de recuperación de **\$2,500 pesos**, adicionales a su paquete elegido, y todo esto es en consideración de la valoración de su médico tratante, es quién puede brindarle mayores informes.

Síguenos por nuestras redes Sociales

-  HospitalDelSagradoCorazon
-  Hospitaldelsagradocorazon
-  @HospitalSagradoCorazon26
-  @HospitalSagradoCorazon26



55-2503-6976
55-3432-7338